

4. مادّے کی پیمائش



- ◀ کیمیائی امتزاج کے قوانین
- ◀ جوہر - جسامت، کمیت، گرفت
- ◀ سالمی کمیت اور مول کا تصور
- ◀ اصلے



1. ڈالٹن کا جوہری نظریہ کیا ہے؟
2. مرکبات کس طرح بنتے ہیں؟
3. نمک، چونے کی کھلی، پانی، چونا، چن کھڑی کے سالمی ضابطے کیا ہیں؟

ذرا یاد کیجیے۔

آپ نے گزشتہ جماعت میں پڑھا ہے کہ عناصر کے درمیان کیمیائی تعاملات کے نتیجے میں مرکبات تیار ہوتے ہیں۔ آپ نے یہ بھی سیکھا ہے کہ ڈالٹن کے جوہری نظریے کا ایک اہم جز یعنی مختلف عناصر کے جوہر ایک دوسرے سے جڑ کر مرکبات کے سالمے تیار ہوتے ہیں۔

کیمیائی امتزاج کے قوانین (Laws of Chemical Combination)

کیمیائی تعاملات کے دوران اشیاء کے مادّوں کی ترتیب میں تبدیلی واقع ہوتی ہے۔ اس ضمن میں اٹھارہویں اور انیسویں صدی کے سائنس دانوں نے بنیادی تجربات کیے۔ تجربات کے لیے استعمال شدہ اشیاء اور حاصل شدہ اشیاء کی بے نقص پیمائش کی۔ ڈالٹن، تھامسن اور روڈر فورڈ جیسے سائنس دانوں نے مادّوں اور جوہروں کی ترتیب کا مطالعہ کر کے کیمیائی تعاملات کے اصول تلاش کیے۔ ڈالٹن کے جوہری نظریے اور کیمیائی تعاملات کے اصولوں کی بنیاد پر سائنس دانوں نے مختلف مرکبات کے سالمی ضابطے لکھے۔ یہاں ہم معلوم سالمی ضابطوں کے ذریعے کیمیائی تعامل کے اصول کی جانچ کریں گے۔

آلات: مخروطی صراحی، امتحانی نلیاں، ترازو وغیرہ۔ کیمیائی اشیاء: کیشیم کلورائیڈ (CaCl_2)، سوڈیم سلفیٹ (Na_2SO_4)، کیشیم آکسائیڈ (CaO)، پانی (H_2O)۔ (شکل 4.1 دیکھیے)



عمل کیجیے۔

عمل 2

- کیشیم کلورائیڈ کا محلول مخروطی صراحی میں لیجیے اور سوڈیم سلفیٹ کا محلول امتحانی نلی میں لیجیے۔
- امتحانی نلی کو دھاگے سے باندھ کر احتیاط کے ساتھ صراحی میں رکھیے۔
- ربر کارک کی مدد سے مخروطی صراحی کو ہوا بند کیجیے۔
- مخروطی صراحی کا ترازو کی مدد سے کمیت معلوم کیجیے۔
- اب مخروطی صراحی کو ترچھا کر کے امتحانی نلی کا محلول مخروطی صراحی کے محلول میں اُنڈیلیے۔
- اب دوبارہ مخروطی صراحی کی کمیت معلوم کیجیے۔
- آپ کو کون سی تبدیلی نظر آئی؟ کیا کمیت میں کچھ تبدیلی دکھائی دی؟


عمل 1

- ایک بڑی مخروطی صراحی میں 56 گرام کیشیم آکسائیڈ لیجیے اور اس میں 18 گرام پانی ڈالے۔
- کیا ہوتا ہے دیکھیے۔
- تیار شدہ نئی شے کی کمیت معلوم کیجیے۔
- کیا یکسانیت نظر آتی ہے؟ نتیجہ اخذ کیجیے۔

.....

.....

.....



4.1 کیمیائی تعاملات کے اصولوں کی جانچ

ماڈے کی بقا کا قانون (Law of Conservation of Matter)

درج بالا سرگرمی میں بنیادی مادے کی کمیت اور کیمیائی تعاملات کے نتیجے میں تیار شدہ مادے کی کمیت یکساں ہی ہے۔ 1785 میں فرانسیسی سائنس داں آنتائین لیوازیے (Antoine Lavoisier) نے اپنی تحقیق سے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ 'کیمیائی تعاملات کے دوران مادے کی کمیت میں اضافہ یا کمی واقع نہیں ہوتی'۔ کیمیائی تعاملات میں حصہ لینے والی عامل اشیا (Reactants) اور کیمیائی تعاملات کے نتیجے میں تیار ہونے والی حاصل اشیا (Products) کی جملہ کمیت مساوی ہوتی ہے۔ اسے مادے کی بقا کا قانون کہتے ہیں۔

مستقل تناسب کا قانون

(Law of Constant Proportion)

فرانسیسی سائنس داں جے۔ ایل پروسٹ (J. L. Proust) نے 1794 میں مستقل تناسب کے قانون کی بنیاد رکھی۔ "مرکبات کے مختلف نمونوں کے بنیادی اجزا کی کمیت کا تناسب ہمیشہ مستقل رہتا ہے۔" مثلاً کسی بھی ذرائع سے حاصل کردہ پانی کے اجزا ہائیڈروجن اور آکسیجن کی کمیت کا تناسب 8 : 1 ہوتا ہے یعنی 1 گرام ہائیڈروجن اور 8 گرام آکسیجن کے کیمیائی تعامل سے 9 گرام پانی تیار ہوتا ہے۔ اسی طرح کسی بھی ذرائع سے حاصل کردہ کاربن ڈائی آکسائیڈ میں کاربن اور آکسیجن کی کمیت کا تناسب 8 : 3 یعنی 44 گرام کاربن ڈائی آکسائیڈ میں 12 گرام کاربن اور 32 گرام آکسیجن ہوتا ہے۔

سائنس دانوں کا تعارف

آنتائین لیوازیے (1743 تا 1794)

یہ ایک فرانسیسی سائنس داں تھے۔ انھیں جدید کیمیا کا موجد کہتے ہیں۔ انھوں نے علم کیمیا کے ساتھ ساتھ علم حیاتیات اور علم معاشیات کے شعبوں میں بھی بھرپور کام کیا ہے۔

1. آکسیجن اور ہائیڈروجن گیسوں کو انھوں نے نام دیا۔
2. شے کے جلنے کے دوران مادے کا آکسیجن کے ساتھ تعامل ہوتا ہے، اس بات کو ثابت کیا۔ (1772)
3. کیمیائی تجربات کے دوران عامل اشیا اور حاصل اشیا کی کمیت معلوم کرنے کے طریقے کا سب سے پہلے استعمال کیا۔
4. انھوں نے دریافت کیا کہ پانی ہائیڈروجن اور آکسیجن سے مل کر بنتا ہے۔
5. کیمیائی تعاملات کے دوران کمیت مستقل رہتی ہے۔ اس اصول پر پہلی بار انھوں نے ہی لکھا۔
6. مرکبات کو مناسب طریقے سے نام دیا۔ مثلاً سلفیورک ایسڈ، کاپر سلفیٹ وغیرہ۔

7. 1789 میں جدید علم کیمیا کی پہلی کتاب لکھی جس کا نام تھا Elementary Treatise on Chemistry



مستقل تناسب کے قانون کی جانچ

کئی مرکبات مختلف طریقوں سے بنائے جاسکتے ہیں مثلاً کاربونیٹ CuCO_3 کے تجزیے اور کارپرائیٹ $\text{Cu}(\text{NO}_3)_2$ کے تجزیے کے نتیجے میں کارپرائیڈ CuO اس مرکب کے دو نمونے حاصل ہوئے۔ ان دونوں نمونوں میں ہر ایک سے 8 گرام کارپرائیڈ لیا گیا اور علیحدہ طور پر ہائیڈروجن گیس کے ساتھ تعامل کیا گیا۔ دونوں میں ہر ایک سے 6.4 گرام تانبا اور 1.8 گرام پانی حاصل ہوا۔ آئیے دیکھیں کہ اس مثال سے مستقل تناسب کا قانون کس طرح ثابت ہوتا ہے۔

کارپرائیڈ کا ہائیڈروجن کے ساتھ تعامل ہو کر پانی جیسے مرکب اور عنصر تانبا ایسے دو معلوم مادے تیار ہوئے۔ ہمیں معلوم ہے کہ ان میں پانی H_2O اس مرکب میں H اور O عناصر 8 : 1 اس کمیت کے تناسب میں ہوتے ہیں۔ یعنی 9 گرام پانی میں 8 گرام آکسیجن عنصر ہوتا ہے۔ اس لیے 1.8 گرام پانی میں $1.6 = \frac{8}{9} \times 1.8$ گرام آکسیجن ہوتا ہے۔ یہ آکسیجن 8 گرام کارپرائیڈ سے حاصل ہوا ہے۔ اس کا مطلب ہوا کہ کارپرائیڈ کے دونوں نمونوں میں ہر ایک 8 گرام مقدار میں 6.4 گرام تانبا اور 1.6 گرام آکسیجن موجود ہے۔ اور اس میں کارپرائیڈ کی کمیت کے تناسب 6.4 : 1.6 یعنی 4 : 1 ہے۔ اسی لیے مادے کے دو مختلف نمونوں کے اجزاء کی کمیت کا تناسب مستقل ہوتا ہے۔ یہ اس تجربے سے واضح ہوتا ہے۔


اب کارپرائیڈ CuO کے سالمی ضابطے کے ذریعے بنیادی اجزاء کی متوقع کمیت کا تناسب کتنا ہوگا دیکھتے ہیں۔ اس کے لیے عناصر کے معلوم جوہری وزن کا استعمال کرنا ہوگا۔ Cu اور O کی جوہری کمیت بالترتیب 63.5 اور 16 ہے۔ یعنی CuO سالمے میں Cu اور O ان بنیادی عناصر کا جوہری کمیتی تناسب 63.5 : 16 یعنی 3.968 : 1 جو اندازاً 4 : 1 ہے۔ تجربے سے حاصل شدہ بنیادی اجزاء کا کمیتی تناسب سالمی وزن کے ذریعے معلوم کیے گئے تناسب کے مساوی دکھائی دیتا ہے یعنی مستقل تناسب کے قانون کی جانچ کی گئی۔

جوہر (Atom) : جسامت، کمیت، گرفت (Size, Mass and Valency)

1. جوہر کی اندرونی ساخت ہوتی ہے۔ یہ کون سے تجربے سے ظاہر ہوا؟ کب؟
2. جوہر کے کون سے دو حصے ہوتے ہیں؟ وہ کس شے سے بنے ہوئے ہوتے ہیں؟



آپ نے پچھلی جماعت میں دیکھا ہے کہ جوہر کے درمیانی حصے میں مرکزہ پایا جاتا ہے اور مرکزے کے بیرونی حصے میں الیکٹرون گردش کرتے ہیں۔ منفی باردار ذرات ہوتے ہیں۔ مرکزے میں مثبت باردار پروٹون اور غیر باردار نیوٹرون بنیادی ذرات ہوتے ہیں۔ بازو میں دی گئی شکل میں فیلڈ آئن ٹرڈین کی مدد سے حاصل کی گئی جوہر کی تصویر دیکھیے۔



4.2 ایٹیم کے جوہر کا عکس

جوہر کی جسامت اس کے نصف قطر کے مطابق ہوتی ہے۔ علیحدہ جوہر میں جوہر کا نصف قطر جوہر کے مرکزے اور انتہائی بیرونی مدار کے درمیان کا فاصلہ ہوتا ہے۔ جوہر کے نصف قطر کی پیمائش نیو میٹر میں (ظاہر) کی جاتی ہے۔

جوہر کی اندازاً جسامت

مثالیں	جوہر کا نصف قطر (میٹر میں)
ہائیڈروجن کا جوہر	10^{-10}
پانی کا سالمہ	10^{-9}
ہیموگلوبن کا سالمہ	10^{-8}

$$\frac{1}{10^9} \text{ m} = 1 \text{ nm}$$

$$1 \text{ m} = 10^9 \text{ nm.}$$

جوہر انتہائی مہین ہوتے ہیں۔ الیکٹرونی خرد بین، فیلڈ آئن خرد بین، اسکیننگ، ٹینلنگ خرد بین جیسے جدید ترین آلات میں جوہر کی بڑی تصویر دکھانے کی طاقت ہوتی ہے۔ شکل 4.2 میں فیلڈ آئن خرد بین کے ذریعے حاصل کردہ جوہر کا عکس بتایا گیا ہے۔

جوہر کی جسامت کا انحصار اس میں موجود الیکٹرون کے مداروں کی تعداد پر ہوتا ہے۔ مدار کی تعداد جتنی زیادہ ہوگی جسامت اتنی زیادہ ہوگی۔ مثال: Na کے جوہر کے مقابلے میں K کا جوہر بڑا ہوتا ہے۔ اگر دو جوہروں کے انتہائی بیرونی مداروں کی تعداد یکساں ہو تب جس جوہر کے انتہائی بیرونی مدار میں زیادہ الیکٹرون ہوتے ہیں اس کی جسامت انتہائی بیرونی مدار میں کم الیکٹرون پائے جانے والے جوہروں کے مقابل چھوٹی ہوتی ہے۔ مثال: Na کے جوہر کے مقابل Mg کا جوہر چھوٹا ہوتا ہے۔

جوہر کی کمیت (Mass of Atom)

جوہر کی کمیت اس کے مرکزے میں مرکوز ہوتی ہے جو اس میں موجود پروٹون (p) اور نیوٹرون (n) کی وجہ سے ہوتی ہے۔ جوہر کے مرکزے میں پائے جانے والے پروٹون اور نیوٹرون کی کل تعداد کو جوہر کی کمیتی عدد (Atomic Mass Number) A، کہا جاتا ہے۔ پروٹون اور نیوٹرون کو مجموعی طور پر مرکزے کے بنیادی ذرات (Nucleons) کہا جاتا ہے۔

جوہر انتہائی مہین ذرہ ہوتا ہے۔ تب اس کی کمیت کس طرح معلوم کی جائے؟ یہ سوال سائنس دانوں کے سامنے بھی تھا۔ انیسویں صدی کے سائنس دانوں کے لیے جوہر کی کمیت صحیح طور پر معلوم کرنا ممکن نہ ہونے کی وجہ سے جوہر کی نسبتی کمیت کا تصور سامنے آیا۔ جوہر کی نسبتی کمیت کی پیمائش کے لیے ایک نمونہ جوہر کی ضرورت تھی۔ ہائیڈروجن کا جوہر سب سے ہلکا ہونے کی وجہ سے ابتدائی زمانے میں ہائیڈروجن کے جوہر کا نمونہ جوہر کے طور پر انتخاب ہوا جس کے مرکزے میں صرف ایک پروٹون ہے۔ ایسے ہائیڈروجن کے جوہر کی موازناتی کمیت ایک (1) اس طرح قبول کیا گیا۔ اس لیے نسبتی جوہر کی کمیت کی قیمت جوہر کی کمیت A کے برابر ہوئی۔

ہائیڈروجن کے نسبتی جوہر کی کمیت ایک (1) رکھنے پر نائٹروجن کے جوہر کی کمیت کس طرح طے کی جائے گی؟

نائٹروجن کے ایک جوہر کی کمیت ہائیڈروجن کے ایک جوہر کے چودہ (14) گنا ہوتی ہے۔ اس لیے نائٹروجن جوہر کی نسبتی کمیت 14 ہے۔ اس کے مطابق مختلف عناصر کی نسبتی جوہر کی کمیت طے کی گئی ہے۔ اس پیمائشی طریقے میں کئی عناصر کی نسبتی جوہر کی کمیتیں عشری اعداد میں طے کی گئیں۔ اس لیے وقت کے ساتھ ساتھ دیگر کئی جوہروں کا نمونہ جوہر کے طور پر انتخاب ہوا۔ بالآخر 1961 میں کاربن کے جوہر کو نمونہ جوہر کے طور پر منتخب کیا گیا۔ اس طریقے میں کاربن کے ایک جوہر کی نسبتی جوہر کی کمیت 12 تسلیم کی گئی۔ کاربن کے جوہر کے مقابلے ہائیڈروجن کے ایک جوہر کی نسبتی جوہر کی کمیت $12 \times \frac{1}{12}$ یعنی 1 ہوتی ہے۔ جوہروں کی نسبتی جوہر کی کمیت کی پٹی پر ایک پروٹون اور ایک نیوٹرون کی کمیت اندازاً ایک (1) ہوتی ہے۔

چند عناصر اور ان کی نسبتی جوہر کی کمیت درج ذیل جدول میں دی گئی ہے جبکہ چند عناصر کی جوہر کی کمیت

آپ معلوم کیجیے۔

تلاش کیجیے۔



جوہر کی کمیت	عناصر	جوہر کی کمیت	عناصر	جوہر کی کمیت	عناصر	جوہر کی کمیت	عناصر
32	سلفر (گندھک)		سوڈیم	12	کاربن	1	ہائیڈروجن
35.5	کلورین	24	مینگنیشم	14	نائٹروجن	4	ہیلیم
	آرگان		ایلمینیم		آکسیجن	7	لیتھیم
	پوٹاشیم	28	سیلیکان	19	فلورین	9	بیریلیم
40	کیلشیم		فاسفورس	20	نیان	11	بوران

آج کے زمانے میں جوہری کمیت کی راست پیمائش کرنے کے بے نقص طریقے ایجاد ہو چکے ہیں۔ اس لیے جوہری کمیت کے لیے نسبتی کمیت کے علاوہ متحدہ کمیت (Unified Mass) اکائی کو قبول کیا گیا ہے۔ اس اکائی کو ڈالٹن کہتے ہیں۔ اس کے لیے u علامت کا استعمال کیا جاتا ہے۔ $1u = 1.66053904 \times 10^{-27} \text{ kg}$

عناصر کی کیمیائی علامتیں (Chemical Symbols of Elements)

1. علم کیمیا میں کسی عنصر کو کس طرح ظاہر کرتے ہیں؟

2. آپ کو معلوم چند عناصر کی علامتیں لکھیے۔

3. اینٹی منی، لوہا، سونا، چاندی، پارہ، سیسہ، سوڈیم کی علامتیں لکھیے۔



بتائیے تو بھلا!

ڈالٹن نے عناصر کو علامتیں دینے کے لیے مخصوص نشانیوں کا استعمال کیا تھا جیسے ہائیڈروجن کے لیے H جبکہ تابنا عنصر کے لیے ©۔ آج ہم IUPAC یعنی (International Union of Pure and Applied Chemistry) کی طے کردہ علامتیں استعمال کرتے ہیں۔ یہ منظور شدہ نام اور علامتیں ہیں جو دنیا بھر میں استعمال کی جاتی ہیں۔ موجودہ کیمیائی علامتوں کا طریقہ برزیلینس کے دریافت کردہ طریقے پر منحصر ہے۔ اس کے مطابق عنصر کی علامت اُس کے نام کے پہلے حرف اور پہلے یا دوسرے یا دیگر مخصوص حروف ہوتے ہیں۔ دوحروف میں سے پہلا حرف انگریزی کا کیپٹل اور دوسرا حرف انگریزی کے چھوٹے حرف میں لکھا جاتا ہے۔

عناصر اور مرکبات کے سالمات (Molecules of Elements and Compounds)

بعض عناصر کے جوہر آزاد وجود رکھتے ہیں مثلاً ہیلیم، نیون۔ یعنی یہ عناصر یک جوہری سالمے کی شکل میں ہوتے ہیں۔ بعض اوقات عناصر کے دو یا زیادہ جوہروں کے تعامل سے ان عناصر کے سالمے تیار ہوتے ہیں۔ ایسے عناصر کثیر جوہری سالمے کی شکل میں ہوتے ہیں۔ مثلاً آکسیجن، نائٹروجن یہ عناصر دو جوہری سالمی حالت میں O_2 ، N_2 اس طرح ہوتے ہیں۔ جب مختلف عناصر کے جوہر ایک دوسرے سے تعامل کرتے ہیں تب مرکبات کے سالمے تیار ہوتے ہیں۔ یعنی عناصر میں کیمیائی کشش کی وجہ سے مرکبات بنتے ہیں۔

یک جوہری اور دو جوہری سالمی حالت میں پائے جانے والے عناصر کی فہرست بنائیے۔

فہرست بنائیے اور گفتگو کیجیے۔



سالمی کمیت اور مول کا تصور (Molecular Mass and Mole Concept)

سالمی کمیت

کسی مادے کی سالمی کمیت یعنی اس مادے کے ایک سالمے میں موجود تمام جوہروں کی جوہری کمیتوں کا مجموعہ ہوتی ہے۔ (جوہری کمیت کی طرح سالمی کمیت کو بھی ڈالٹن (u) اکائی سے ظاہر کرتے ہیں۔)

H_2O کی سالمی کمیت کس طرح معلوم کی جاسکتی ہے؟

سالمہ	بنیادی عناصر	جوہری کمیت u	سالمے میں جوہروں کی تعداد	جوہری کمیت × جوہروں کی تعداد	اجزاء کی کمیت u
H_2O	ہائیڈروجن	1	2	1×2	2
	آکسیجن	16	1	16×1	16
سالمی کمیت 18	اجزاء کے جوہری کمیت کا مجموعہ = سالمی کمیت H_2O کی سالمی کمیت $\rightarrow (H \text{ کی جوہری کمیت}) \times 2 + (O \text{ کی جوہری کمیت}) \times 1$				

ذیل میں چند عناصر کی جوہری کمیتیں ڈالٹن اکائی میں دی ہوئی ہیں اور چند مرکبات کے سالمی ضابطے دیے ہوئے ہیں۔ ان مرکبات کی سالمی کمیت معلوم کیجیے۔



جوہری کمیت ← (1) H ، (16) O ، (14) N ، (12) C ، (39) K ، (32) S ، (40) Ca ، (23) Na ، (35.5) Cl ، (27) Al ، (24) Mg

سالمی ضابطے ← NaOH ، HNO₃ ، H₂SO₄ ، MgO ، Ca(OH)₂ ، AlCl₃ ، H₂O₂ ، KNO₃ ، MgCl₂ ، NaCl

مول (Mole)



1. ترازو میں تور دال، مسور دال، چنا دال میں ہر ایک کے ایک دانے کی کمیت معلوم کیجیے۔ آپ کو کیا تجربہ ہوا؟
2. تور دال، مسور دال، چنا دال کے ہر ایک کے 10 گرام کی کمیت اور ان دانوں کی تعداد معلوم کیجیے۔ ہر ایک کی تعداد ایک جیسی ہے یا مختلف؟
3. کاغذ پر ایک خاکہ بنائیے۔ اسے رنگ دینے کے لیے ہر لکیر پر سلسلہ وار تور، مسور اور چنا دال گن کر چسپاں کیجیے۔ تصویر مکمل کر کے تور دال، مسور دال اور چنا دال کتنے گرام استعمال ہوئی ہے، معلوم کیجیے۔ دال کے دانوں کی تعداد درجن میں معلوم کیجیے۔
4. مساوی تعداد کی دالوں کی کمیت اور مساوی کمیت کی دالوں کے دانوں کی تعداد سے متعلق آپ نے کیا نتیجہ اخذ کیا؟

ایک ایکڑ زمین میں بوائی کے لیے گیہوں، جوار اور باجرہ کے کتنے بیج درکار ہوں گے؟ اس لحاظ سے اس کمیت کا ہر اناج کے دانوں کی تعداد میں کیا تعلق ہو سکتا ہے؟



1. کیا ترازو کی مدد سے کسی بھی مادے کے ایک سالمے کی کمیت معلوم کرنا ممکن ہے؟



2. کیا مختلف مادوں کے یکساں کمیت والی مقدار میں ان مادوں کے سالموں کی تعداد یکساں ہوگی؟
 3. مختلف مادوں کے سالمے یکساں مقدار میں لینا ہو تو ان مادوں کے یکساں کمیت کی مقدار لینے سے کام بن سکتا ہے؟
- عناصر اور مرکبات جب کیمیائی تعاملات میں حصہ لیتے ہیں تب ان کے جوہر اور سالموں کے درمیان تعامل ہوتا ہے۔ اس لیے ان کے جوہر اور سالموں کی تعداد معلوم ہونی چاہیے۔ لیکن کیمیائی تعاملات کرتے وقت جوہر اور سالموں کی پیمائش کی بجائے آسانی سے پیمائش کی جاسکے ایسی مقدار گن کر لینا آسان ہوتا ہے۔ اس کے لیے مول تصور کا استعمال ہوتا ہے۔
- مول مادہ کی ایسی مقدار ہوتی ہے جس میں مادہ کی گرام میں کمیت اس مادے کے سالمی کمیت کی ڈالٹن قیمت کے مساوی ہوتی ہے۔ جس طرح آکسیجن کی سالمی کمیت 32 ہے۔ 32 گرام آکسیجن یعنی 1 مول آکسیجن ہوتی ہے۔ پانی کی سالمی کمیت 18 ہے اس لیے 18 گرام پانی یعنی 1 مول پانی ہوتا ہے۔

$$\frac{\text{مادے کی گرام میں کمیت}}{\text{مادے کی سالمی کمیت}} = \text{مول کی تعداد (n)}$$

مرکب کا ایک مول یعنی مرکب کے سالمی کمیت کے برابر قیمت والی گرام میں کمیت ہوتی ہے۔
مول (mol) یہ SI اکائی ہے۔

ایواگیڈرو کا عدد (Avagadro's Number)

کسی بھی مادے کی ایک مول مقدار میں سالموں کی تعداد محدود ہوتی ہے۔ اٹلی کے سائنس داں ایواگیڈرو نے اس ضمن میں بنیادی تحقیق کی ہے۔ اس لیے اس تعداد کو ایواگیڈرو عدد کہتے ہیں اور اسے N_A اس علامت سے ظاہر کرتے ہیں۔ آگے چل کر سائنس دانوں نے مختلف تجربات کی روشنی میں ایواگیڈرو عدد کی قیمت 6.022×10^{23} معلوم کی۔ کسی بھی مادے کا ایک مول یعنی 6.022×10^{23} سالے۔ جس طرح 1 درجن یعنی 12، ایک صدی یعنی 100، ایک گراس یعنی 144 اسی طرح 1 مول یعنی 6.022×10^{23} ۔ مثلاً 1 مول پانی یعنی 18 گرام پانی تب اس میں پانی کے 6.022×10^{23} سالے ہوتے ہیں۔

66 گرام CO_2 میں کتنے سالے ہوں گے؟

حل: کاربن ڈائی آکسائیڈ (CO_2) کی سالمی کمیت 44 ہے۔

$$\frac{66}{44} = \frac{CO_2 \text{ کی گرام میں کمیت}}{CO_2 \text{ کی سالمی کمیت}} = (n) \text{ مول کی تعداد}$$

$$1.5 = n \text{ (مول) (mol)}$$

$$\therefore 1 \text{ مول } CO_2 \text{ میں } 6.022 \times 10^{23} \text{ سالے ہوتے ہیں۔}$$

$$\therefore 1.5 \text{ مول } CO_2 \text{ میں } 1.5 \times 6.022 \times 10^{23} \text{ سالے} = 9.033 \times 10^{23} \text{ سالے ہوتے ہیں۔}$$

144 بیاضوں کو مجموعی طور پر
1 گراس بیاضیں کہتے ہیں۔



1 درجن کیلے
12 کیلے



1 مول نمک = 6.022×10^{23} سالے



1 مول پانی = 6.022×10^{23} سالے

4.3: ایک (1) مول (ایواگیڈرو عدد)

آئیے، دماغ پر زور دیں۔

1. 36 گرام پانی میں پانی کے کتنے سالے ہوں گے؟
2. 49 گرام سلفیورک ایسڈ H_2SO_4 میں H_2SO_4 کے کتنے سالے ہوں گے؟

اسے ہمیشہ ذہن میں رکھیں۔

1. کسی مادے کی دی ہوئی مقدار میں سالموں کی تعداد اس مادے کی سالمی کمیت سے طے کی جاتی ہے۔
2. مختلف مادوں کے یکساں کمیت کی مقدار میں سالموں کی تعداد مختلف ہوتی ہے۔
3. مختلف مادوں کے 1 مول مقدار کی گرام میں کمیت مختلف ہوتی ہے۔


گرفت (Valency)

1. H_2O ، HCl ، H_2 اور NaCl ان سالمی ضابطوں پر سے H ، Cl ، O اور Na ان عناصر کی گرفت طے کیجیے۔



2. MgCl_2 ، NaCl ان مرکبات میں کس قسم کی کیمیائی بندش ہے؟

عناصر کی مرکبات بنانے کی استعداد کو گرفت کہتے ہیں۔ عناصر کی گرفت کو مخصوص عدد سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ یہ عدد اُس عنصر کے ایک جوہر نے دیگر جوہروں کے ساتھ بنائی ہوئی کیمیائی بندشوں کی تعداد ہوتی ہے۔ 18 ویں اور 19 ویں صدی میں عناصر کی گرفت سمجھنے کے لیے کیمیائی مرکبات کے اصولوں کا استعمال ہوتا تھا۔ بیسویں صدی میں عناصر کی گرفت کا اس کے الیکٹرونی تشکیل کے ساتھ تعلق سامنے آیا۔



سوڈیم کا ایک جوہر ایک الیکٹرون کلورین کے جوہر کو دیتا ہے تو سوڈیم کا مثبت آئن تیار ہوتا ہے۔ اس لیے سوڈیم کی گرفت 1 ہے۔ کلورین کا جوہر ایک الیکٹرون حاصل کرتا ہے تو کلورین کا منفی آئن (کلورائیڈ) تیار ہوتا ہے۔ اس لیے کلورین کی گرفت 1 ہے۔ آئن میں ہر ایک پر ایک ایک مخالف برقی بار کے درمیان کشش کی وجہ سے Na^+ اور Cl^- میں ایک کیمیائی بندش بن کر NaCl تیار ہوتا ہے۔

سائنسی شیشی :

مثبت بار والے آئن کو کیٹائن (مثبت آئن) اور منفی بار والے آئن کو اینائن (منفی آئن) کہتے ہیں۔ مثال : MgCl_2 میں Mg^{++} ، Cl^- اس طرح مثبت اور منفی آئن ہوتے ہیں۔ عناصر کے انتہائی بیرونی مدار میں پائے جانے والے الیکٹرون کو گرفتی الیکٹرون کہتے ہیں۔

اس طرح سوڈیم جوہر کی استعداد ایک الیکٹرون دینے کی اور کلورین جوہر کی استعداد ایک الیکٹرون حاصل کرنے کی ہے۔ یعنی سوڈیم اور کلورین دونوں عناصر کی گرفت 1 ہے۔

آپنی بندش بننے وقت عنصر کا جوہر جتنے الیکٹرون کھوتا ہے یا حاصل کرتا ہے وہ تعداد اس عنصر کی گرفت ہوتی ہے۔

CaO اور MgCl_2 یہ مرکبات عناصر کے ذریعے کس طرح تیار ہوں گے؟

آئیے، دماغ پر زور دیں۔



اداروں کے کام : قومی کیمیائی تجربہ گاہ، پونہ (National Chemical Laboratory, Pune) علم کیمیا کے مختلف شعبوں میں تحقیق کرنا، تجارت کو فروغ دینا اور ملک کے قدرتی وسائل کے فائدہ مند استعمال کی غرض سے نئی تکنیک کو ترقی دینا ان مقاصد کو مد نظر رکھتے ہوئے CSIR کے ایک شعبے کے طور پر اس تجربہ گاہ کا قیام 1950 میں ہوا۔ حیاتی ٹکنالوجی، نیونٹکنا لوجی، تھاماسی عمل (Catalysis)، ادویات، آلات، زراعتی کیمیائی ماڈے، نباتی بافتوں کا تحفظ اور پالیمر سائنس (Polymer Science) جیسے مختلف ضمنی شعبوں میں تحقیقی سرگرمیاں اس تجربہ گاہ کے ذریعے عمل میں لائی جاتی ہیں۔

دیے جانے والے یا حاصل کیے جانے والے الیکٹرون کی تعداد ہمیشہ مکمل عدد ہوتی ہے۔ اس لیے گرفت ہمیشہ مکمل عدد ہی ہوتی ہے۔

ذیل کی جدول کو مکمل کیجیے۔

ایک سے زائد گرفت

مختلف حالات میں بعض عناصر کے جوہر مختلف تعداد میں الیکٹرون کھوتے ہیں یا حاصل کرتے ہیں۔ ایسے وقت وہ عناصر ایک سے زائد گرفت ظاہر کرتے ہیں۔

عناصر	جوہری عدد	الیکٹرونی تشکیل	گرفت
ہائیڈروجن	1	1	1
ہیلیم	2	2	0
لیتھیم		(2, 1)	
بیریلیم	4		2
بورون	5	(2, 3)	
کاربن		(2, 4)	4
نائٹروجن	7		3
آکسیجن		(2, 6)	6
فلورین	9		7
نیون	10		
سوڈیم		(2, 8, 1)	1
میگنیشیم	12		2
ایلمینیم	13	(2, 8, 3)	
سیلیکان	14		4

اسے ہمیشہ ذہن میں رکھیں۔

لوہا (آئرن) 2 اور 3 مختلف گرفتیں ظاہر کرتا ہے۔ اس لیے کلورین کے ساتھ $FeCl_2$ اور $FeCl_3$ جیسے دو مرکبات تیار ہوتے ہیں۔

ایک سے زائد گرفت ظاہر کرنے والے چند عناصر

عناصر	علامت	گرفتیں	آین	نام
تانبا	Cu	1 اور 2	Cu^+	کیوپرس
			Cu^{2+}	کیوپرک
پارہ	Hg	1 اور 2	Hg^+	مرکیورس
			Hg^{2+}	مرکیورک
لوہا	Fe	2 اور 3	Fe^{2+}	فیرس
			Fe^{3+}	فیرک

اصلیے (Radicals)

ذیل کی جدول میں مرکبات سے حاصل ہونے والے کیٹائن اور اینائن لکھیے۔



اساس	کیٹائن	اینائن	تیزاب	کیٹائن	اینائن
NaOH			HCl		
KOH			HBr		
$Ca(OH)_2$			HNO_3		

آینی بندش والے مرکبات کے دو حصے ہوتے ہیں؛ کیٹاین (مثبت باردار آئن) اور ایناین (منفی باردار آئن)۔ دونوں آئن آزادانہ طور پر کیمیائی تعاملات میں حصہ لیتے ہیں۔ اس لیے انھیں اصلیہ کہتے ہیں۔ کیٹاین اصلیہ کی جوڑی ہائیڈروآکسائیڈ اس ایناین اصلیہ کے ساتھ بننے پر مختلف اساس تیار ہوتے ہیں جیسے NaOH، KOH۔ اس لیے کیٹاین اصلیوں کو اساسی اصلیہ کہتے ہیں۔ مختلف اساسوں کے درمیان کا فرق ان اساسی اصلیوں کی وجہ سے واضح ہوتا ہے۔ اس کے برعکس ایناین اصلیہ کی جوڑی ہائیڈروجن آئن اس کیٹاین اصلیہ کے ساتھ بننے پر مختلف تیزاب تیار ہوتے ہیں، جیسے HCl، HBr۔ اس لیے ایناین اصلیوں کو تیزابی اصلیہ کہتے ہیں۔ مختلف تیزابوں کے درمیان کا فرق ان تیزابی اصلیوں کی وجہ سے واضح ہوتا ہے۔

ذیل کے اصلیوں میں تیزابی اور اساسی اصلیہ کون کون سے ہیں؟

Ag^+ , Cu^{2+} , Cl^- , I^- , SO_4^{2-} , Fe^{3+} , Ca^{2+} , NO_3^- , S^{2-} , NH_4^+ , K^+ , MnO_4^- , Na^+



عام طور پر اساسی اصلیہ دھاتوں کے جوہر میں سے الیکٹرون علیحدہ کرنے پر تیار ہوتے ہیں۔ جیسے Cu^{2+} , Na^+ لیکن اس میں کچھ استثناءات ہوتے ہیں مثلاً NH_4^+ ، اسی طرح تیزابی اصلیہ عام طور پر دھاتوں کے جوہر میں الیکٹرون کا اضافہ کرنے پر تیار ہوتے ہیں جیسے Cl^- , S^{2-} لیکن اس میں کچھ استثناءات ہوتے ہیں مثلاً: MnO_4^- ۔

ذیل کے اصلیوں کے دو گروہ میں جماعت بندی کیجیے۔ جماعت بندی کرتے وقت ان پر

موجود برقی بار کی علامت کے علاوہ دیگر پیمانے کا استعمال کیجیے۔



Ag^+ , Mg^{2+} , Cl^- , SO_4^{2-} , Fe^{2+} , ClO_3^- , NH_4^+ , Br^- , NO_3^-

ایک ہی جوہر رکھنے والے اصلیہ سادہ اصلیہ کہلاتے ہیں۔ مثلاً Cl^- , Cu^+ , Na^+ ۔

جب کوئی اصلیہ باردار جوہروں کا مجموعہ ہوتا ہے تب اسے مرکب اصلیہ کہتے ہیں، مثلاً NH_4^+ , SO_4^{2-} اصلیوں پر موجود برقی بار کی

تعداد اُس اصلیہ کی گرفت ہوتی ہے۔

مرکبات کے کیمیائی ضابطے - ایک جائزہ

آینی بندش سے تیار ہونے والے مرکبات کی یہ خصوصیت ہوتی ہے کہ ان کے سالمے میں کیٹاین اور ایناین دو حصے ہوتے ہیں۔ یعنی اساسی اور تیزابی اصلیہ۔ دونوں حصے مختلف برقی باردار ہوتے ہیں۔ ان کے درمیان کی قوت کشش دراصل آینی بندش ہوتی ہے۔ آینی مرکبات کے نام میں دو لفظ ہوتے ہیں۔ پہلا لفظ کیٹاین کا نام ہوتا ہے جبکہ دوسرا لفظ ایناین کا نام ہوتا ہے۔ مثلاً سوڈیم کلورائیڈ جیسے مرکب کا کیمیائی ضابطہ لکھتے وقت کیٹاین کی علامت بائیں جانب اور اس سے منسلک دائیں جانب ایناین کی علامت لکھی جاتی ہے۔ سالمی ضابطہ لکھتے وقت آینوں پر برقی بار ظاہر نہیں کیا جاتا۔ لیکن اُن آینوں کی تعداد علامتوں کے دائیں جانب قاعدے میں لکھی جاتی ہے۔ مرکب اصلیہ کی تعداد 2 یا زیادہ رہنے پر اصلیہ کی علامت قوس میں لکھ کر تعداد قوس کے باہر لکھی جاتی ہے۔ گرفتوں کی ترجمانی ضرب کے طریقے میں یہ تعداد حاصل کرنا آسان ہوتا ہے۔ مثلاً سوڈیم سلفیٹ اس مرکب کا کیمیائی ضابطہ لکھنے کے مرحلے اگلے صفحے پر ہیں۔

اطلاعاتی مواصلاتی تکنالوجی سے تعلق

ویب سائٹس

www.organic.chemistry.org

www.masterorganicchemistry.com

www.rsc.org.learnchemistry

ماڈے کی پیمائش اور دیگر معلومات کے مطالعے کے لیے بازو دیے گئے ویب سائٹس کی مدد لیجیے۔

عناصر کی جوہری کمیت، الیکٹرونی تشکیل اور گرفتوں سے متعلق

اسپریڈ شیٹ تیار کیجیے۔


مرحلہ 1 : اسیلیوں کی علامت لکھنا (اساسی اسیلیہ بائیں جانب)



مرحلہ 2 : علامتوں کے نیچے ان کی گرفت لکھیے۔



مرحلہ 3 : اسیلیوں کی تعداد حاصل کرنے کے لیے تیر کے نشان کے مطابق ترچھی ضرب کیجیے۔



مرحلہ 4 : مرکب کا سالمی ضابطہ لکھنا۔



مختلف مرکبات کے کیمیائی ضابطے لکھنے کے لیے ان کے اسیلیوں کی علامت معلوم ہونا ضروری ہے۔ ذیل کی جدول میں ہمیشہ استعمال ہونے والے اسیلیے، ان کی علامتیں برقی بار کے ساتھ دی ہوئی ہیں۔

آئن/اسیلیے

اساسی اسیلیے

H ⁺	ہائیڈروجن	Al ³⁺	الیومینیم
Na ⁺	سوڈیم	Cr ³⁺	کرومیم
K ⁺	پوٹاشیم	Fe ³⁺	فیرک
Ag ⁺	چاندی	Au ³⁺	سونا
Cu ⁺	کیوپرس	Sn ⁴⁺	اسٹانک
Hg ⁺	مرکیورس	NH ₄ ⁺	امونیم
Mg ²⁺	مگنیشیم		
Cu ²⁺	کیوپرک/کاپر		
Ca ²⁺	کیلشیم		
Ni ²⁺	نکل		
Co ²⁺	کوبالٹ		
Hg ²⁺	مرکیورک		
Mn ²⁺	مینگنیز		
Fe ²⁺	فیرس (آئرن II)		
Sn ²⁺	اسٹینس		
Pt ²⁺	پلاٹینم		

تیزابی اسیلیے

H ⁻	ہائیڈرائیڈ	MnO ₄ ⁻	پرمینگنیٹ
F ⁻	فلورائیڈ	ClO ₃ ⁻	کلورائیٹ
Cl ⁻	کلورائیڈ	BrO ₃ ⁻	برومیٹ
Br ⁻	برومائیڈ	IO ₃ ⁻	آئیوڈائیٹ
I ⁻	آئیوڈائیڈ	CO ₃ ²⁻	کاربونیٹ
O ²⁻	آکسائیڈ	SO ₄ ²⁻	سلفیٹ
S ²⁻	سلفائیڈ	SO ₃ ²⁻	سلفائیٹ
N ³⁻	نائٹرائیڈ	CrO ₄ ²⁻	کرومیٹ
		Cr ₂ O ₇ ²⁻	ڈائکرومیٹ
		PO ₄ ³⁻	فاسفیٹ
OH ⁻	ہائیڈروآکسائیڈ		
NO ₃ ⁻	نائٹریٹ		
NO ₂ ⁻	نائٹرائٹ		
HCO ₃ ⁻	ہائے کاربونیٹ		
HSO ₄ ⁻	ہائے سلفیٹ		
HSO ₃ ⁻	ہائے سلفائیٹ		

آین/ اصلییے اس جدول اور ترجمہ ضرب کے طریقے کا استعمال کر کے درج ذیل مرکبات کے کیمیائی ضابطے تیار کیجیے۔




کیلشیم کاربونیٹ، سوڈیم بائے کاربونیٹ، سلور کلورائیڈ، میگنیشیم آکسائیڈ، کیلشیم ہائیڈرو آکسائیڈ، امونیم فاسفیٹ، کیوپرس برومائڈ، کاپرسلفیٹ، پوٹاشیم نائٹریٹ، سوڈیم ڈائکرومیٹ۔



مشق



5. درج ذیل مرکبات کے نام لکھیے اور سالمی کیت معلوم کیجیے۔



6. دو مختلف طریقوں سے چن کھڑی کے M اور N دو نمونے حاصل ہوئے۔ ان کے اجزاء کی تفصیل ذیل کے مطابق ہے۔

نمونہ 'M' کیت : 7 گرام

آکسیجن کی کیت : 2 گرام

کیلشیم کی کیت : 5 گرام

نمونہ 'N' کیت : 1.4 گرام

آکسیجن کی کیت : 0.4 گرام

کیلشیم کی کیت : 1 گرام

اس بنا پر کیمیائی تعاملات کا کون سا قانون ثابت ہوتا ہے، واضح کیجیے۔

7. درج ذیل مقداروں میں اشیاء کے سالموں کی تعداد معلوم کیجیے۔

32 گرام آکسیجن، 90 گرام پانی، 8.8 گرام کاربن ڈائی آکسائیڈ، 7.1 گرام کلورین

8. درج ذیل اشیاء کے 0.2 مول حاصل کرنے کے لیے ان کی کتنی گرام مقدار درکار ہوگی؟

سوڈیم کلورائیڈ، میگنیشیم آکسائیڈ، کیلشیم کاربونیٹ

سرگرمی : دفتیاں، چھوٹے مقناطیس کی پٹیاں اور ایرلڈائٹ کا استعمال کر کے مختلف اسیلوں کے ماڈل تیار کیجیے اور ان کے ذریعے مختلف مرکبات کے سالمے بنائیے۔



1. مثالیں لکھیے۔

(الف) مثبت آئن

(ب) اساسی اسیلے

(ج) مرکب اسیلے

(د) ایک سے زائد گرفت والے دھاتیں

(ه) دوگرفت تیزابی اسیلے

(و) تین گرفت اساسی اسیلے

2. درج ذیل عناصر سے بننے والے اسیلوں کی علامت لکھ کر ان پر برقی بار ظاہر کیجیے۔

پارہ، پوٹاشیم، نائٹروجن، تانبا، کاربن، سلفر، کلورین، آکسیجن

3. درج ذیل مرکبات کے کیمیائی ضابطے لکھنے کے مراحل لکھیے۔

سوڈیم سلفیٹ، پوٹاشیم نائٹریٹ، فیرک فاسفیٹ، کیلشیم آکسائیڈ، ایلومینیم ہائیڈروکسائیڈ

4. درج ذیل سوالوں کے جواب وضاحت کے ساتھ لکھیے۔

(الف) سوڈیم عنصر یک گرفت کس طرح ہے؟

(ب) M دوگرفت دھات ہے۔ سلفیٹ اور فاسفیٹ اسیلوں کے ساتھ تیار ہونے والے مرکبات کے کیمیائی ضابطے تلاش کرنے کے مراحل لکھیے۔

(ج) جوہری کیت کے لیے نمونہ جوہر ضرورت کو واضح کیجیے۔ دو نمونہ جوہروں کی معلومات دیجیے۔

(د) جوہر کی مجموعی کیت سے کیا مراد ہے؟

(ه) ماڈے کے مول سے کیا مراد ہے؟ مثال کے ذریعے واضح کیجیے۔