

16.1 تعارف

آپ مختلف قسم کے اعداد جیسے طبعی اعداد، مکمل اعداد، صحیح اعداد اور ناطق اعداد کے بارے میں پڑھ چکے ہیں۔ ان کی بہت سی دلچسپ خصوصیات کا بھی مطالعہ کر چکے ہیں۔ چھٹی جماعت میں ہم نے اجزائے ضربی اور اضعاف کو معلوم کرنے کا طریقہ دریافت کیا تھا اور یہ بھی دیکھا تھا کہ ان کے درمیان کیا رشتے قائم کیے جاسکتے ہیں۔ اس باب میں ہم اعداد کے بارے میں مزید تفصیلی معلومات حاصل کریں گے۔ یہ تصورات تقسیم پذیری کی جانچ کی تصدیق کرنے میں ہماری مدد کریں گے۔



16.2 عمومی شکل میں اعداد

آئیے عدد 52 کو لیتے ہیں اور اس کو درج ذیل طریقہ سے لکھتے ہیں

$$52 = 50 + 2 = 10 \times 5 + 2$$

اسی طرح، عدد 37 کو بھی یوں لکھا جاسکتا ہے

$$37 = 10 \times 3 + 7$$

یہاں ab کا مطلب
 $a \times b$ نہیں ہے!

عمومی طور پر a اور b سے بنا کوئی بھی دو ہندسی عدد ab اس طرح لکھا جاسکتا ہے

$$ab = 10 \times a + b = 10a + b$$

$$ba = 10 \times b + a = 10b + a$$

ba کے بارے میں کیا کہا جاسکتا ہے؟

آئیے اب عدد 351 لیتے ہیں۔ یہ ایک تین ہندسی عدد ہے۔ اس کو ہم اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں

$$351 = 300 + 50 + 1 = 100 \times 3 + 10 \times 5 + 1 \times 1$$

$$497 = 100 \times 4 + 10 \times 9 + 1 \times 7$$

اسی طرح

عمومی طور پر a ، b اور c سے بنا ایک تین ہندسی عدد abc اس طرح لکھا جاسکتا ہے

یہاں سندرہ عدد 49 کا انتخاب کرتا ہے۔ ہندسہ پلٹنے پر اسے عدد 94 حاصل ہوتا ہے، پھر وہ ان دو اعداد کو جمع کر کے $94 + 49 = 143$ حاصل کرتا ہے۔ آخر میں اس عدد کو 11 سے تقسیم دے کر اس نے $143 \div 11 = 13$ حاصل کیا اور کوئی باقی نہیں رہا۔ یہی وہ بات ہے جس کی میناکشی نے پیش گوئی کی۔

کوشش کیجیے

جانچ کیجیے اگر سندرہ نے مندرجہ ذیل اعداد منتخب کیے ہوتے تو کیا نتیجہ حاصل ہوتا۔

17 .4

64 .3

39 .2

27 .1



آئیے اب ہم دیکھیں کہ کیا ہم میناکشی کی ”ترکیب“ کی وضاحت کر سکتے ہیں۔

مان لیجیے سندرہ عدد ab منتخب کرتا ہے جو 2 ہندسوں کے عدد $10a + b$ کی مختصر شکل ہے۔ ہندسوں کو پلٹنے پر وہ عدد $ba = 10b + a$ حاصل ہوتا ہے ان دونوں اعداد کو جمع کرنے پر اسے حاصل ہوتا ہے:

$$(10a + b) + (10b + a) = 11a + 11b$$

$$= 11(a + b)$$

اس لیے حاصل جمع ہمیشہ 11 کا ایک ضعف ہے جیسا کہ میناکشی نے دعویٰ کیا تھا۔

غور کیجیے اگر حاصل جمع کو 11 سے تقسیم کریں تو خارج قسمت $(a + b)$ حاصل ہوتا ہے۔ یہ خارج قسمت منتخب کیے گئے دو ہندسی عدد ab کے ہندسوں کے حاصل جمع کے برابر ہوگا۔

اب آپ مذکورہ بالا جانچ کوئی بھی دو ہندسی عدد کو لے کر کر سکتے ہیں۔

میناکشی اور سندرہ کا کھیل جاری رہتا ہے!

میناکشی : ایک دوسرے 2 ہندسی عدد کے بارے میں سوچو، لیکن مجھے نہیں بتانا کہ تم نے کیا سوچا ہے۔

سندرہ : ٹھیک ہے۔

میناکشی : اب ہندسوں کو پلٹ دو اور بڑے عدد میں سے چھوٹے عدد کو گھٹا دو۔

سندرہ : میں نے گھٹا لیا۔ اب آگے کیا کرنا ہے؟

میناکشی : اب اپنے جواب کو 9 سے تقسیم کرو، میرا دعویٰ ہے کہ کچھ بھی باقی نہیں بچے ہوگا۔

سندرہ : ہاں تم صحیح کہہ رہی ہو، حقیقت میں کچھ باقی صفر نہیں ہے۔ لیکن اس بارے میں میں جانتا ہوں کہ تم اتنی پُر امید کیوں ہو!

حقیقت میں سندرہ نے عدد 29 سوچا تھا اس کے ہندسوں کو پلٹ کر اس نے عدد 92 حاصل کیا۔ پھر اس نے $92 - 29 = 63$

$$abc = 100 \times a + 10 \times b + 1 \times c$$

$$= 100a + 10b + c$$

اس طرح سے

$$cab = 100c + 10a + b$$

$$bca = 100b + 10c + a$$

وغیرہ۔

کوشش کیجیے

1. مندرجہ ذیل اعداد کو عمومی شکل میں لکھیے۔

302 (iv)

129 (iii)

73 (ii)

25 (i)

2. مندرجہ ذیل کو عام شکل میں لکھیے۔

$$100 \times a + 10 \times c + b \quad (\text{iii})$$

$$100 \times 7 + 10 \times 1 + 8 \quad (\text{ii})$$

$$10 \times 5 + 6 \quad (\text{i})$$



16.3 اعداد کے ساتھ کھیل

(i) ہندسوں کی جگہ بدلنا - دو ہندسی عدد

میناکشی نے سندرم سے کسی 2 ہندسی عدد کے بارے میں سوچنے کے لیے کہا اور یہ بھی کہا کہ وہ جیسا کہتی جائے ویسا ہی کرے۔ ان کی بات چیت کو مندرجہ ذیل شکل میں ظاہر کیا گیا ہے۔ مہربانی کر کے آگے بڑھنے سے پہلے غور سے شکل کو دیکھیے۔

میناکشی اور سندرم میں بات چیت: پہلا دور.....

2 ہندسی عدد کا انتخاب کیجیے

ٹھیک ہے [منتخب عدد 49 ہے]

سندرم

نئے ٹھیک ہے، میں بدلتا ہوں... (94 حاصل ہوتا ہے)

نیا عدد حاصل کرنے کے لیے ہندسوں کو پلٹے

میناکشی

ٹھیک ہے... (143 حاصل ہوتا ہے)

اسے اس عدد میں جمع کر دو جس سے آپ نے شروع کیا تھا

ٹھیک ہے (13 ہوتا ہے)

اب حاصل شدہ عدد کو 11 سے تقسیم کرو

ہاں، تم صحیح کہہ رہی ہو۔ لیکن تمہیں کیسے پتہ چلا؟

کوئی باقی نہیں ہونا چاہیے!

• فرق: $594 = 943 - 349$

• ہندسہ پلٹنے پر ملنے والا عدد: 943

• تقسیم: $594 \div 99 = 6$ ، باقی صفر

کوشش کیجیے



جانچ کیجیے کہ اگر میناکشی نے مندرجہ ذیل اعداد کا انتخاب کیا ہوتا تو کیا نتیجہ حاصل ہوتا؟
ہر حالت میں آخر میں حاصل ہوئے خارج قسمت کا ایک ریکارڈ دیکھیے۔

901 .4

737 .3

469 .2

132 .1

آئیے دیکھیں کہ یہ ترکیب کیسے کام کرتی ہے۔

مان لیجیے میناکشی کے ذریعہ منتخب کیا گیا تین ہندسوں کا عدد $abc = 100a + 10b + c$ ہے۔

ہندسوں کو پلٹنے پر وہ عدد $cba = 100c + 10b + a$ حاصل کرتی ہے۔ گھٹانے پر حاصل ہوگا:

• اگر $c < a$ ہے تو اعداد کا فرق ہے

$$(100a + 10b + c) - (100c + 10b + a) = 100a + 10b + c - 100c - 10b - a$$

$$= 99a - 99c = 99(a - c)$$

• اگر $c > a$ ہے تو اعداد کا فرق ہے

$$(100c + 10b + a) - (100a + 10b + c) = 99c - 99a = 99(c - a)$$

• بے شک اگر $a = c$ ہے تو فرق صفر ہے۔

ہر ایک حالت میں اس نتیجہ سے ملا عدد 99 سے تقسیم ہوتا ہے۔ اس لیے باقی 0 حاصل ہوتا ہے۔ غور کیجیے کہ خارج قسمت $a - c$ یا

$c - a$ ہوگا، آپ تین ہندسوں کے دوسرے اعداد لے کر اس حقیقت کی جانچ کر سکتے ہیں۔

(ii) دیے ہوئے تین ہندسوں سے تین ہندسی عدد بنانا۔

اب ایک بار پھر میناکشی کی باری ہے۔

میناکشی: تین ہندسوں کا کوئی عدد سوچیے۔

سندرہ: ٹھیک ہے میں نے ایسا کر لیا ہے۔

میناکشی: اب اس عدد کا استعمال دوسرے تین ہندسوں کے عدد بنانے میں اس طرح کرو، اگر تم نے عدد abc کو منتخب کیا ہے تو

• پہلا عدد cab (یعنی اکائی کا ہندسہ اس عدد کے سب سے ”بائیں سرے“ پر پہنچ گیا ہے)؛

• دوسرا عدد bca (یعنی سیکڑے کا ہندسہ اس عدد کے سب سے ”دائیں سرے“ پر پہنچ گیا ہے)۔

حاصل کیا اور آخر میں اس نے $(63 \div 9)$ حاصل کیا جو حاصل تقسیم 7 دیتا ہے اور کچھ باقی نہیں ہے۔

کوشش کیجیے

جانچ کیجیے اگر سندرم نے اوپر کے لیے مندرجہ ذیل اعداد منتخب کیے ہوتے، تو کیا نتیجہ حاصل ہوتا۔

37 .4.

96 .3.

21 .2.

17 .1.



آئیے دیکھیں کہ سندرم میناکشی کی دوسری ترکیب کو کس طرح معلوم کرتا ہے (اب وہ ایسا کرنے میں خود اعتمادی محسوس کرتا ہے!)

مان لیجیے وہ 2 ہندی عدد ab یعنی $ab = 10a + b$ منتخب کرتا ہے۔ ہندسوں کو پلٹنے پر وہ عدد $ba = 10b + a$ حاصل ہوتا ہے اس لیے میناکشی اسے بڑے عدد میں سے چھوٹا عدد گھٹانے کو کہتی ہے۔

• اگر دہائی کا ہندسہ اکائی کے ہندسہ سے بڑا ہے (یعنی $a > b$ ہے) تو وہ اس طرح گھٹاتا ہے:

$$(10a + b) - (10b + a) = 10a + b - 10b - a \\ = 9a - 9b = 9(a - b)$$

• اگر اکائی کا ہندسہ دہائی کے ہندسہ سے بڑا ہے (یعنی $b > a$) تو وہ اس طرح کرتا ہے:

$$(10b + a) - (10a + b) = 9(b - a)$$

• اور بے شک جب $a = b$ ہے تو وہ 0 حاصل ہوتا ہے۔

ہر ایک حالت میں حاصل شدہ عدد 9 سے تقسیم ہو جاتا ہے۔ اس لیے باقی 0 ہے۔ غور کیجیے کہ اگر ہم گھٹانے پر حاصل شدہ نتیجہ میں ملے عدد کو 9 سے تقسیم کریں تو ہمیں $a > b$ یا $a < b$ کے مطابق $a - b$ یا $b - a$ حاصل ہوتا ہے۔ آپ کسی دوسرے دو ہندی عدد کو لے کر اپروردی گئی حقیقت کی جانچ کر سکتے ہیں۔

(ii) ہندسوں کا پلٹنا - تین ہندی عدد

اب سندرم کی باری ہے کہ وہ کچھ ترکیب ظاہر کرے:

سندرم : ایک تین ہندسوں کا عدد سوچیے لیکن اس کے بارے میں مجھے نہ بتائیں۔

میناکشی : ٹھیک ہے۔

سندرم : اب ان کو الٹی ترتیب (پلٹتے ہوئے) میں لے کر ایک نیا عدد بنائیے اور بڑے عدد میں سے چھوٹا عدد گھٹائیے۔

میناکشی : ٹھیک ہے میں نے گھٹا لیا ہے۔ آگے کیا کرنا ہے؟

سندرم : اپنے جواب کو 99 سے تقسیم کیجیے میں یقینی طور پر کہہ سکتا ہوں کہ باقی صفر ہوگا!

حقیقت میں، میناکشی نے تین ہندی عدد 349 کا انتخاب کیا۔ اس لیے، اسے حاصل ہوا:

1. پھیلی میس، ہر حرف صرف ایک ہی ہندسہ سے ظاہر کرنا چاہیے۔ ہر ہندسہ صرف ایک ہی حرف سے ظاہر کیا جانا چاہیے۔

2. عدد کا پہلا ہندسہ صفر نہیں ہو سکتا۔ اس طرح، ہم عدد ”تریسٹھ“ کو 63 لکھتے ہیں، یا 0063 بھی نہیں۔ ایک اصول یہ ہے کہ ایک پہلی کا صرف ایک ہی جواب ہونا چاہیے۔

مثال 1: مندرجہ ذیل جمع میں Q معلوم کیجیے۔

$$\begin{array}{r} 31Q \\ + 1Q3 \\ \hline 501 \end{array}$$

حل:

یہاں صرف ایک حرف Q ہے جس کی ہمیں قدر معلوم کرنی ہے۔
اکائی کے کالم میں اوپر دیے گئے جمع کا مطالعہ کیجیے: $Q + 3$ سے ہمیں '1' حاصل ہوتا ہے، یعنی ایک عدد جس کی اکائی کا ہندسہ 1 ہے۔ ایسا ہونے کے لیے Q ہندسہ 8 ہونا چاہیے۔ اس لیے اس پہلی کو ذیل میں دکھائے گئے طریقہ سے حل کیا جاسکتا ہے۔

$$\begin{array}{r} 318 \\ + 183 \\ \hline 501 \end{array}$$

یعنی، $Q = 8$ ہے۔

مثال 2: مندرجہ ذیل جمع میں A اور B معلوم کیجیے۔

$$\begin{array}{r} A \\ + A \\ + A \\ \hline B \quad A \end{array}$$

حل: اس میں دو حروف A اور B ہیں جن کی قدر معلوم کرنی ہے۔

اکائی کے کالم میں جمع پر غور کیجیے: تین A کا حاصل جمع ایک ایسا عدد ہونا چاہیے جس کی اکائی کا ہندسہ A ہو، یہ تبھی ہوگا جب $A = 0$

ہو اور $A = 5$ ہو۔

اب ان اعداد کو جمع کیجیے۔ نتیجہ میں حاصل ہوئے عدد کو 37 سے تقسیم کیجیے۔ میرا دعویٰ ہے کہ باقی صفر ہوگا۔

سندرم : ہاں، تم صحیح ہو!

در اصل سندرم نے تین ہندسوں کا عدد 237 سوچا تھا۔ جیسا میناکشی نے کرنے کو کہا تھا ویسا کرنے کے بعد اسے اعداد 723 اور 372 حاصل ہوئے۔ اس لیے اس نے یہ کیا:

$$\begin{array}{r} 237 \\ + 723 \\ + 372 \\ \hline 1332 \end{array}$$

تین ہندسوں 2, 3 اور 7 کا استعمال کر کے تین ہندسوں والے بھی ممکنہ اعداد بنائے اور ان کے حاصل جمع حاصل کیجیے۔ جانچ کیجیے کہ کیا حاصل جمع 37 سے تقسیم ہو جاتا ہے! کیا یہ عدد abc کے تینوں ہندسوں a, b اور c، یعنی بھی اعداد کے حاصل جمع کے لیے صحیح ہے؟

پھر اس نے نتیجہ میں حاصل ہوئے عدد 1332 کو 37 سے تقسیم دی۔

$$1332 \div 37 = 36 \text{ باقی کچھ نہیں ہے۔}$$

کوشش کیجیے

جانچ کیجیے کہ اگر سندرم کے سوچے ہوئے اعداد مندرجہ ذیل ہوتے تو کیا نتیجہ حاصل ہوتا؟

1. 417 2. 632 3. 117 4. 937



کیا یہ ترکیب ہمیشہ کام کرتی ہے؟

آئیے دیکھیں

$$abc = 100a + 10b + c$$

$$cab = 100c + 10a + b$$

$$bca = 100b + 10c + a$$

$$abc + cab + bca = 111(a + b + c)$$

$$\text{جو کہ } 37 \text{ سے تقسیم ہوتا ہے} \quad = 37 \times 3(a + b + c)$$

16.4 ہندسوں کے لیے حروف

یہاں کچھ پہیلیاں ہیں جن میں ایک ریاضی کے 'مجموعہ' کے سوال میں ہندسوں کے مقام پر حروف ہیں اور یہ معلوم کرنا ہے کہ کون سا حرف کن ہندسوں کو ظاہر کرتا ہے اس لیے یہ ایک قسم کے کوڈ کو حل کرنے جیسی صورت ہے۔ یہاں ہم جمع اور ضرب کے مسئلوں تک ہی محدود رہیں گے۔

ایسی پہیلیوں کو حل کرتے وقت اپنا جانے والے دو اصول اس طرح ہیں۔



مجموعہ ایک تین ہندسوں کا عدد dad ہے

$$ab + ba = dad \quad \text{یعنی}$$

$$(10a + b) + (10b + a) = dad$$

$$11(a + b) = dad$$

حاصل جمع $a+b$ عدد 18 سے زیادہ نہیں ہو سکتا (کیوں؟)۔

کیا dad ، 11 کا ایک ضعف ہے؟

کیا dad ، 198 سے کم ہے؟

198 تک تین ہندسوں کے ایسی سبھی اعداد لکھیے جو 11 کے اضعاف ہیں؟

a اور d کی قدریں معلوم کیجیے۔

مشق 16.1

مندرجہ ذیل میں سے ہر ایک میں حروف کی قدریں معلوم کیجیے اور اس میں شامل اقدام کی وجوہات بھی بتائیے۔

$$\begin{array}{r} 1 \quad A \quad .3 \\ \times \quad A \\ \hline 9 \quad A \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 4 \quad A \quad .2 \\ 9 \quad 8 \\ \hline C \quad B \quad 3 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 3 \quad A \quad .1 \\ + \quad 2 \quad 5 \\ \hline B \quad 2 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} A \quad B \quad .6 \\ \times \quad 5 \\ \hline C \quad A \quad B \end{array}$$

$$\begin{array}{r} A \quad B \quad .5 \\ \times \quad 3 \\ \hline C \quad A \quad B \end{array}$$

$$\begin{array}{r} A \quad B \quad .4 \\ + \quad 3 \quad 7 \\ \hline 6 \quad A \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 2 \quad A \quad B \quad .9 \\ + \quad A \quad B \quad 1 \\ \hline B \quad 1 \quad 8 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} A \quad 1 \quad .8 \\ + \quad 1 \quad B \\ \hline B \quad 0 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} A \quad B \quad .7 \\ \times \quad 6 \\ \hline B \quad B \quad B \end{array}$$

اگر $A = 0$ ہے، حاصل جمع $0 + 0 + 0 = 0$ ہوگا، جس سے $B = 0$ ہو جائے گا۔ ہم یہ نہیں چاہتے (کیوں کہ اس سے $A = B$ ہو جائے گا اور BA کی دہائی کا ہندسہ بھی 0 ہو جائے گا)، لہذا ہم ان ممکنات میں سے اسے ترک کر دیتے ہیں۔ اس لیے، $A = 5$ ہے۔ یہ پہلی نیچے دکھائے گئے طریقہ سے حل کی جاسکتی ہے۔

$$\begin{array}{r} 5 \\ + 5 \\ + 5 \\ \hline 15 \end{array}$$

یعنی $A = 5$ اور $B = 1$ ہے۔

مثال 3: A اور B ہندسوں کو معلوم کیجیے۔

$$\begin{array}{r} B A \\ \times B 3 \\ \hline 57A \end{array}$$

حل:

یہاں بھی دو حروف A اور B ہیں جن کی قدریں معلوم کرنی ہیں۔

کیوں کہ $3 \times A$ کا اکائی کا ہندسہ A ہے تو $A = 0$ یا $A = 5$ ہونا چاہیے۔

اب B کو دیکھیے۔ اگر $B = 1$ ہو تو $BA \times B3$ کی قدر زیادہ سے زیادہ 19×19 ہونی چاہیے؛ یعنی 361 کے مساوی ہوگی۔ لیکن یہاں حاصل ضرب $57A$ ہے جو 500 سے زیادہ ہے۔ اس لیے ہمارے پاس $B = 1$ نہیں ہو سکتا۔

ہمارے پاس اگر $B = 3$ ہو تو $BA \times B3$ کا حاصل ضرب 30×30 سے زیادہ ہوگا۔ یعنی یہ 900 سے زیادہ ہوگا۔ لیکن $57A$ کی قدر 600 سے کم ہے۔ اس لیے B ، 3 کے برابر نہیں ہو سکتا۔

اوپر دونوں حقیقتوں کو نظر میں رکھتے ہوئے $B = 2$ ہو سکتا ہے۔ اس لیے دی ہوئی ضرب یا تو 20×23 ہوگی یا 25×23 ہوگی۔

پہلی ممکنہ صورت نہیں ہو سکتی کیوں کہ $20 \times 23 = 460$ ہے۔ لیکن دوسری ممکنہ بات صحیح ہے، کیوں کہ $25 \times 23 = 575$ ہے۔

اس لیے جواب $A = 5$ اور $B = 2$ ہے۔

$$\begin{array}{r} 25 \\ \times 23 \\ \hline 575 \end{array}$$

اسے کیجیے

2 ہندسوں کا ایک عدد ab لکھیے اور اس کے ہندسوں کو پلٹنے پر حاصل شدہ عدد ba لکھیے۔ ان کا مجموعہ معلوم کیجیے۔ مان لیجیے یہ

اس لیے، کوئی عدد 10 سے تب تقسیم ہو سکتا ہے جب اس کا اکائی کا ہندسہ 0 ہو۔

16.5.2 5 سے تقسیم پذیری

5 کے اضعاف کو دیکھیے۔

5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50

ہم دیکھتے ہیں کہ اکائی کا ہندسہ 5 اور 0 ایک عدد چھوڑ کر آ رہے ہیں اور ان کے علاوہ اکائی کے مقام پر کوئی اور ہندسہ نہیں آ رہا ہے۔

اس لیے ہمیں 5 سے تقسیم ہونے کا یہ اصول حاصل ہوتا ہے۔

اگر کسی عدد کی اکائی کا ہندسہ 5 یا 0 ہے تو وہ عدد 5 سے تقسیم ہوتا ہے۔

آئیے اس اصول کی تشریح کریں۔ کسی عدد $cba...$ کو اس طرح لکھا جاسکتا ہے:

$$... + 100c + 10b + a$$

چونکہ 10 اور 100 10 سے تقسیم ہوتے ہیں اس لیے $100c$ ، $10b$ ، ... بھی 10 سے تقسیم ہو جائیں گے اور یہی بعد میں 5 سے بھی تقسیم ہوں گے کیونکہ $10 = 2 \times 5$ ہے۔ جہاں تک عدد a کا سوال ہے تو اگر یہ عدد 5 سے تقسیم ہوتا ہے تو اسے بھی 5 سے تقسیم ہونا چاہیے۔ اس لیے a کو یا تو 0 یا 5 ہونا چاہیے۔

کوشش کیجیے

(پہلا سوال آپ کی مدد کے لیے حل کیا گیا ہے)

1. اگر تقسیم $N \div 5$ سے باقی 3 حاصل ہوتا ہے تو N کی اکائی کا ہندسہ کیا ہو سکتا ہے؟ (اکائی کے ہندسے کو 5 سے تقسیم دینے پر باقی 3 آنا چاہیے۔ اس لیے اکائی کا ہندسہ 3 یا 8 ہوگا۔)
2. اگر تقسیم $N \div 5$ سے باقی 1 حاصل ہوتا ہے تو N کی اکائی کا ہندسہ کیا ہو سکتا ہے؟
3. اگر تقسیم $N \div 5$ سے باقی 4 حاصل ہوتا ہے تو N کی اکائی کا ہندسہ کیا ہو سکتا ہے؟

16.5.3 2 سے تقسیم پذیری

یہ سبھی جفت اعداد ہیں۔

2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22...

اور یہ طاق اعداد ہیں۔

1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21...



$$\begin{array}{r}
 1 \quad 2 \quad A \quad .10 \\
 + \quad 6 \quad A \quad B \\
 \hline
 A \quad 0 \quad 9
 \end{array}$$

16.5 تقسیم کی جانچ

چھٹی جماعت میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ مندرجہ ذیل قاسموں سے تقسیم کی جانچ کس طرح کی جاتی ہے۔

$$10, 5, 2, 3, 6, 4, 8, 9, 11.$$

آپ کو ان کی جانچ کرنے کے قاعدے آسان لگے ہوں گے لیکن ساتھ ہی حیرانی بھی ہوئی ہوگی کہ یہ کیوں کام کرتے ہیں۔ اس باب ہم میں ان کے ”کیوں“ والے پہلو پر غور کریں گے۔

16.5.1 10 سے تقسیم پذیری

یہ حقیقت میں سب سے آسان جانچ ہے۔ ہم پہلے 10 کے کچھ اضعاف کو دیکھتے ہیں۔

$$10, 20, 30, 40, 50, 60, \dots,$$

اس کے ساتھ 10 کے کچھ غیر اضعاف کو دیکھتے ہیں۔

$$13, 27, 32, 48, 55, 69,$$

ان اعداد سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایسے اعداد جن کے اکائی کا ہندسہ 0 ہے 10 کے اضعاف ہیں اور وہ اعداد جن کے اکائی کا ہندسہ 0 نہیں ہے 10 کا ضعف نہیں ہے۔ اس سے ہمیں 10 سے تقسیم پذیری کی جانچ کا ایک اصول حاصل ہوتا ہے۔

بے شک ہمیں صرف جانچ کا اصول دے کر ہی نہیں ٹھہر جانا چاہیے بلکہ ہمیں یہ بھی معلوم کرنا چاہیے کہ جانچ کا یہ اصول کس طرح کام کرتا ہے۔ یہ مشکل نہیں ہے۔ ہمیں صرف مقامی قدر کے اصولوں کو یاد رکھنا چاہیے۔

کوئی عدد cba لیجیے۔ یہ مندرجہ ذیل عدد کی مختصر شکل ہے

$$\dots + 100c + 10b + a$$

یہاں a اکائی کا ہندسہ ہے، b دہائی کا ہندسہ ہے، c سیکڑے کا ہندسہ ہے وغیرہ وغیرہ۔ یہاں تین نقطے یہ دکھاتے ہیں کہ c کے بائیں طرف اور ہندسے ہو سکتے ہیں۔

کیوں کہ $10, 100, 1000, \dots$ سے تقسیم ہو جاتے ہیں۔ اس لیے $10, 100, c, \dots$ بھی 10 سے تقسیم ہوں گے۔ جہاں تک عدد کا سوال ہے اگر دیا ہوا عدد 10 سے تقسیم ہوتا ہے تو a کو بھی 10 سے تقسیم ہونا چاہیے۔ یہ بھی ممکن ہے جب $a = 0$ ہے۔

اس کی پھیلی ہوئی شکل $3 \times 1000 + 5 \times 100 + 7 \times 10 + 3$ ہے۔

یہ یکساں ہے $3 \times (999 + 1) + 5 \times (99 + 1) + 7 \times (9 + 1) + 3$

$$= 3 \times 999 + 5 \times 99 + 7 \times 9 + (3 + 5 + 7 + 3) \quad \dots (1)$$

ہم دیکھتے ہیں کہ عدد 9 یا 3 سے اسی وقت تقسیم ہوگا جب $(3+5+7+3)$ عدد 9 یا 3 سے تقسیم ہو جائے۔

ہم دیکھتے ہیں کہ $18 = (3+5+7+3)$ عدد 9 اور 3 سے تقسیم ہوتا ہے اس لیے عدد 3573، 9 اور 3 سے تقسیم ہو جائے گا۔

آئیے اب عدد 3576 پر غور کریں۔ جیسا کہ ہم اوپر دیکھ چکے ہیں یہاں ہمیں حاصل ہوتا ہے

$$3576 = 3 \times 999 + 5 \times 99 + 7 \times 9 + (3 + 5 + 7 + 6) \quad \dots (2)$$

$(3+5+7+6)=21$ ، 9 سے تقسیم نہیں ہوتا لیکن 3 سے تقسیم ہو جاتا ہے۔

اس لیے 3576 عدد 9 سے تقسیم نہیں ہوتا لیکن یہ 3 سے تقسیم ہو جاتا ہے۔ اس لیے:

(i) عدد N عدد '9' سے تقسیم ہو جائے گا اگر ہندسوں کا حاصل جمع 9 سے تقسیم ہو ورنہ وہ 9 سے تقسیم نہیں ہوگا۔

(ii) عدد N عدد '3' سے تقسیم ہو جائے گا اگر ہندسوں کا حاصل جمع 3 سے تقسیم ہوتا ہو ورنہ یہ 3 سے تقسیم نہیں ہوگا۔

اگر عدد 'cba' ہے تو $100c + 10b + a = 99c + 9b + (a + b + c)$

=

3 اور 9 سے تقسیم پذیر ہے

اس لیے، 9 اور 3 کی تقسیم پذیری اس وقت ممکن ہے جب $a + b + c$ ، 9 (یا 3) سے تقسیم ہو۔

مثال 4: 21436587 کی 9 سے تقسیم پذیری کی جانچ کیجیے۔

حل: 21436587 کے ہندسوں کا حاصل جمع $2 + 1 + 4 + 3 + 6 + 5 + 8 + 7 = 36$ ہے۔ یہ حاصل جمع $36 \div 9 = 4$ سے تقسیم ہوتا ہے۔

اس لیے ہم یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ 21436587 عدد 9 سے تقسیم ہو جائے گا۔ ہم دوبارہ جانچ کر سکتے ہیں:

$$= 2381843 \quad (\text{تقسیم صحیح ہے})$$

مثال 5: 152875 کی 9 سے تقسیم پذیری کی جانچ کیجیے۔

حل: 152875 کے ہندسوں کا حاصل جمع $1 + 5 + 2 + 8 + 7 + 5 = 28$ ہے۔ یہ عدد 9 سے تقسیم نہیں ہوتا۔ ہم نتیجہ نکالتے ہیں کہ

152875 عدد 9 سے تقسیم نہیں ہوتا ہے۔

ہم دیکھتے ہیں کہ ایک طبعی عدد جفت ہوتا ہے اگر اس کا اکائی کا ہندسہ

0 یا 2, 4, 6, 8 ہو

ایک عدد طاق ہوتا ہے اگر اس کا اکائی کا ہندسہ

1 یا 3, 5, 7 یا 9 ہو

چھٹی جماعت میں پڑھ چکے 2 سے تقسیم پذیری کی جانچ کے اصولوں کو یاد کیجیے۔ یہ اصول اس طرح ہیں

اگر کسی عدد کا اکائی کا ہندسہ 0, 2, 4, 6 یا 8 ہو تو وہ عدد 2 سے تقسیم ہوتا ہے۔

اس کی تشریح اس طرح ہے۔

کسی بھی عدد cba کو $100c + 10b + a$ کی شکل میں لکھا جاسکتا ہے۔

اس کے پہلے دو ارکان $100c$ اور $10b$ عدد 2 سے تقسیم ہوتے ہیں کیوں کہ عدد 10 اور 100 عدد 2 سے تقسیم ہوتے

ہیں۔ جہاں تک a کا سوال ہے اگر دیا ہوا عدد 2 سے تقسیم ہوتا ہے تو اسے بھی 2 سے تقسیم ہونا چاہیے۔ یہ اسی وقت ممکن ہے جب

$a = 0, 2, 4, 6, 8$ ہو۔

کوشش کیجیے

(پہلا سوال آپ کی مدد کے لیے حل کیا گیا ہے۔)

1. اگر تقسیم $N \div 2$ سے باقی 1 حاصل ہوتا ہے تو N کی اکائی کا ہندسہ کیا ہو سکتا ہے؟

(N طاق ہے، اس لیے اس کی اکائی کا ہندسہ طاق ہوگا۔ اس لیے N کی اکائی کا ہندسہ 1, 3, 5, 7 یا 9 ہوگا۔)

2. اگر تقسیم $N \div 2$ سے کوئی باقی حاصل نہیں ہوتا ہے (یعنی باقی 0 ہے) تو N کی اکائی کا ہندسہ کیا ہو سکتا ہے؟

3. مان لیجیے تقسیم $N \div 5$ سے باقی 4 اور تقسیم $N \div 2$ سے باقی 1 حاصل ہوتا ہے۔ تو N کی اکائی کا ہندسہ کیا ہونا چاہیے؟



16.5.4 9 اور 3 سے تقسیم پذیری

اب تک معلوم کیے گئے تقسیم پذیری کی جانچ کے 3 اصولوں کو غور سے دیکھیے جو 2, 5, 10 اور 2 سے تقسیم کی جانچ کے لیے تھے۔ ہمیں

ان میں ایک بات یکساں نظر آتی ہے: ان میں دیے ہوئے عدد کے صرف اکائی کے ہندسہ کا استعمال ہوتا ہے اور

دوسرے ہندسوں سے ان پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ اس طرح سے تقسیم پذیری کا فیصلہ صرف اکائی کے ہندسہ

سے ہی ہو جاتا ہے۔ 2, 5, 10 عدد 10 کے قاسم ہیں جو ہمارے مقامی قدر کے نظام میں ایک اہم عدد ہے۔

لیکن 9 سے تقسیم پذیری کی جانچ میں یہ اصول کارگر نہیں ہے۔ آئیے کوئی عدد جیسے 3573 کو لیجیے۔

($11 = 3 \div 3$)۔ اس لیے ہم نتیجہ نکالتے ہیں کہ 2146587، عدد 3 سے تقسیم ہوگا۔

مثال 8 : 15287 کی 3 سے تقسیم پذیری کی جانچ کیجیے۔

حل : 15287 کے ہندسوں کا حاصل جمع $7 + 8 + 2 + 5 + 1 = 23$ ہے۔ یہ 3 سے تقسیم نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے ہم نتیجہ نکالتے ہیں کہ 15287 عدد 3 سے تقسیم نہیں ہوگا۔



کوشش کیجیے

مندرجہ ذیل اعداد کی 3 سے تقسیم پذیری کی جانچ کیجیے۔

1. 108 2. 616 3. 294 4. 432 5. 927

مشق 16.2

1. اگر 9 کا ایک ضعف $21y^s$ ہے جہاں y ایک ہندسہ ہے تو y کی قدر کیا ہے؟
2. اگر 9 کا ایک ضعف $31z^s$ ہے جہاں z ایک ہندسہ ہے تو z کی قدر کیا ہے؟
آپ دیکھیں گے کہ اس کے دو جواب ہیں۔ ایسا کیوں ہے؟
3. اگر $24x$ ، 3 کا ایک ضعف ہے جہاں x ایک ہندسہ ہے تو x کی قدر کیا ہے؟ (کیوں کہ $24x$ ، 3 کا ایک ضعف ہے اس لیے اس کے ہندسوں کا حاصل جمع $6 + x$ ، 3 کا ایک ضعف ہے۔ یعنی $6 + x$ مندرجہ ذیل میں سے کوئی ایک عدد ہوگا۔ $0, 3, 6, 9, 12, 15, 18, \dots$ یعنی x ایک ہندسہ ہے اس لیے $6 + x = 6$ یا 9 یا 12 یا 15 ہو سکتے ہیں۔ اس لیے $x = 0$ یا 3 یا 6 یا 9 ہو سکتا ہے۔ اس لیے x کی قدر ان چاروں مختلف قدروں میں سے ایک ہو سکتی ہے۔
4. اگر $31z^s$ ، 3 کا ایک ضعف ہے جہاں z ایک ہندسہ ہے تو z کی قدر کیا ہو سکتی ہے؟

ہم نے کیا سیکھا؟

1. اعداد کو ہم عمومی شکل میں لکھ سکتے ہیں۔ اس طرح ایک دو ہندسی عدد ab کو $ab = 10a + b$ لکھا جائے گا۔
2. اعداد کی عمومی شکلیں عددی کھیل اور پہیلیوں کو حل کرنے میں مددگار ہوتی ہیں۔
3. اگر اعداد کو عمومی شکل میں لکھا جائے تو اعداد 9، 2، 5، 10 یا 3 کے ذریعے تقسیم پذیری کو وجہ بتائی جاسکتی ہے۔

کوشش کیجیے

مندرجہ ذیل اعداد کی 9 سے تقسیم پذیری کی جانچ کیجیے۔

1. 108 2. 616 3. 294 4. 432 5. 927



مثال 6: اگر تین ہندسوں کا عدد $24x$ ، 9 سے تقسیم ہوتا ہے تو x کی قدر کیا ہے؟

حل: چونکہ $24x$ ، عدد 9 سے تقسیم ہوتا ہے۔ اس لیے اس کے ہندسوں کا حاصل جمع $2 + 4 + x$ ، 9 سے تقسیم ہونا چاہیے، یعنی $6 + x$ ، 9 سے تقسیم ہونا چاہیے۔

یہ اسی وقت ممکن ہے جب $9 = 6 + x$ ہو یا 18۔ کیوں کہ x ایک ہندسہ ہے اس لیے $6 + x = 9$ ہوگا، یعنی $x = 3$ ہے۔

سوچیے، بحث کیجیے اور لکھیے

1. آپ دیکھ چکے ہیں کہ 450 کو 10 سے تقسیم کیا جاسکتا ہے۔ اسے 2 اور 5 سے بھی تقسیم کیا جاسکتا ہے جو 10 کے اجزائے ضربی ہیں۔ اسی طرح عدد 135 کو 9 سے تقسیم کیا جاسکتا ہے۔ اسے 3 سے بھی تقسیم کیا جاسکتا ہے جو 9 کا ایک جزو ضربی ہے۔ کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ اگر کوئی عدد m ، x سے تقسیم ہوتا ہو تو وہ m کے ہر ایک جزو ضربی سے بھی تقسیم ہوگا۔

2. تین ہندسوں کے ایک عدد abc کو $100a + 10b + c$ کی شکل میں لکھیے۔

$$= 99a + 11b + (a - b + c)$$

$$= 11(9a + b) + (a - b + c)$$

اگر عدد abc ، 11 سے تقسیم ہو تو آپ $(a - b + c)$ کے بارے میں کیا کہہ سکتے ہیں؟

کیا یہ ضروری ہے کہ $(a + c - b)$ ، 11 سے تقسیم ہو؟

(ii) ایک چار ہندسوں کے عدد $abcd$ کو اس طرح لکھیے $1000a + 100b + 10c + d$

$$= (1001a + 99b + 11c) - (a - b + c - d)$$

$$= 11(91a + 9b + c) + [(b + d) - (a + c)]$$

اگر عدد $abcd$ ، 11 سے تقسیم ہو تو $[(b + d) - (a + c)]$ کے بارے میں آپ کیا کہہ سکتے ہیں؟

(iii) اوپر دیے گئے (i) اور (ii) سے، آپ کیا کہہ سکتے ہیں کہ کوئی عدد 11 سے تقسیم ہوگا اگر اس کے طاق مقاموں کے ہندسوں کا

حاصل جمع اور جفت مقاموں کے ہندسوں کا حاصل جمع کا فرق 11 سے تقسیم ہوتا ہے؟

مثال 7: 2146587 کی 3 سے تقسیم پذیری کی جانچ کیجیے۔

حل: 2146587 کے ہندسوں کا حاصل جمع $2 + 1 + 4 + 6 + 5 + 8 + 7 = 33$ ہے۔ یہ 3 سے تقسیم ہو جاتا ہے یعنی

نوٹ

© NCERT
not to be republished